

Управление Роспотребнадзора Республике Алтай обращает внимание граждан, планирующих туристические, деловые и иные поездки в страны тропического и субтропического климата, на эпидемиологическое неблагополучие по лихорадкам Денге и чикунгунья в этих регионах. Переносчиками данных заболеваний от больного человека к здоровому являются комары.

Лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

В 2013 году в Таиланде отмечается самый высокий за последние 20 лет подъем заболеваемости. Количество пострадавших составило 153 000, из них погибло 132 человека. Наибольший риск заражения российских туристов лихорадкой Денге наблюдается при выезде в Таиланд, Перу, Индонезию, Вьетнам, Бангладеш, Гонконг.

Лихорадка чикунгунья получила распространение почти в 40 странах Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки. Наиболее распространена в Индии, островах Индийского океана, Доминиканской Республике, Колумбии, Венесуэле.

В целях профилактики заражения лихорадками Денге, чикунгунья и другими геморрагическими лихорадками, передающимися трансмиссивным путем, гражданам, выезжающим в неблагополучные страны, необходимо помнить:

- о риске заражения лихорадками Денге и чикунгунья;

- о необходимости индивидуальной защиты от укусов кровососущих насекомых (применение репеллентов, одежды с длинными рукавами, обработка одежды инсектицидным материалом, применения фумигаторов);

- при появлении симптомов заболевания после возвращения из стран, неблагополучных по геморрагическим лихорадкам, незамедлительно обращаться за медицинской

помощью и информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

Справочно.

Лихорадка чикунгунья переносится комарами. Вскоре после укуса у человека появляется температура до 40 градусов, кожная сыпь, боль и ломота в мышцах, усталость, головная боль. Обычно симптомы болезни появляются через 4-8 дней после укуса человека инфицированным комаром, но этот период может составлять от 2 до 12 дней. Каких-либо специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет. Лечение направлено, главным образом, на облегчение симптомов, включая боль в суставах, с помощью жаропонижающих средств, оптимальных болеутоляющих препаратов и жидкости.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, передающаяся с укусами mosquitos, преобладает в тропических и субтропических регионах. Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.